N° 23. Mercredi, 21 Mars 1906.

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

MAY 3 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

M. Boulay. Des paresthésies pharyngées.

F. Jayle. Méthode de réduction en position génu-cubitale de l'utérus rétroversé et rétrofléchi.

Ch. Gandy. La réaction des urines au bleu de méthylène dans la fièvre typhoïde.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Asthme et tuberculose.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de chirurgie de New-York. — Traitement opératoire de la division palatine. — Sténose pylorique congénitale. — Pancréatite aiguë; cholélithiase. — Anastomose bout à bout pour cancer de l'angle splénique. — Résection du rectum pour rétrécissement syphilitique avec anastomose bout à bout. — Résection du côlon. — Résection intestinale suivie d'anastomose bout à bout.

Académie de chirurgie de Philadelphie. — Plaie du poumon par coup de poignard. Suture. — Gastro-entérostomie pour ulcère de l'estomac. — Incision transversale pour extirper l'appendice. — Abcès appendiculaire pointant du côté droit du scrotum chez un malade exempt de hernie. — Cure radicale de la hernie inguinale directe. — Calcul du canal cystique.

Société império-royale des médecins de Vienne. — Valeur séméiologique et traitement de la tuberculose de l'uretère compliquant la tuberculose rénale.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Rupture de l'aorte au cours d'une endocardite ulcéro-végétante. — Œdème aigu de la langue. — Cancer de l'ampoule de Vater.

Société anatomique. — Circulation rénale. — Fibrome utérin énucléé dans le ligament large. — Appendicite. — Cardite rhumatismale aiguë.

Société de biologie. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans la congestion hépatique liée à l'asystolie. — Origine du mucus trouvé dans les fèces au cours des entérites. — Analyse de l'air des mines. — Dosage de l'acique urique. — De la constitution du suc pancréatique.

Académie des sciences. — La tuberculine absorbée par le tube digestif. — Analyse des bacilles tuberculeux. — La réaction du sang, fonction de la nutrition. — Erratum.

Académie de médecine. — Propriétés de l'extrait de graines du cotonnier. — Prophylaxie des maladies contagieuses dans les stations balnéaires. — Poussières et tuberculose. — La désinfection et la déclaration obligatoires de la tuberculose (*suite de la discussion*). — Du traitement des atrophies musculaires consécutives aux épanchements articulaires (et en particulier à l'hydarthrose) par la méthode du travail musculaire avec progression des résistances. — Etude anatomo-clinique et histologique sur la surdi-mutité.

ANALYSES

Pathologie chirurgicale. — L. Née. De la luxation du semi-lunaire.

Chirurgie. — Ehrhardt. L'extirpation du thymus dans l'asthme thymique. — E. Jouon. Décollement épiphysaire supérieur du corps de la 12e vertèbre dorsale, laminectomie, mort.

Pédiatrie. — E. Rousseau. La lymphangite gangreneuse du scrotum chez le nourrisson.

CHRONIQUE

Armand Carel. Le laboratoire municipal et l'allaitement maternel, ou les conséquences imprévues d'une analyse de lait.

CORRESPONDANCE

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

L. Bouchacourt. Hygiène de la grossesse et puériculture intra-utérine.

NOUVELLES

LE LABORATOIRE MUNICIPAL ET L'ALLAITEMENT MATERNEL

OU LES CONSÉQUENCES IMPRÉVUES D'UNE ANALYSE DE LAIT

Le 15 Février dernier, j'ai été appelé à donner mes soins à l'enfant D..., âgé de quatre mois et dont les parents habitent le quartier de Javel, dans le XVe arrondissement.

Cet enfant, né le 8 Octobre 1905 a été d'abord élevé au sein par sa mère. D'après la maman, l'enfant était très fort et très vigoureux, la mère avait beaucoup de lait, beaucoup trop, semble-t-il, puisque l'enfant présentait quelques troubles digestifs, selles nombreuses et vertes qui inquiétèrent la mère dans le courant de Janvier; l'enfant ne profitait plus. Le traitement conseillé à ce moment ne produisit aucun résultat appréciable. L'enfant fut alors sevré, mais la situation loin de s'améliorer s'aggrave rapidement et lorsqu'on nous le fait voir, l'enfant est dans un état lamentable, facies athrepsique, diarrhée et vomissements incessants, aucune parcelle alimentaire n'est assimilée. La mère, quoique ayant fait passer son lait, en a encore quelques gouttes dans ses seins, mais l'enfant n'a plus la force de téter et il s'éteint, le 25 Février, après un semblant d'amélioration pendant deux ou trois jours.

Cette observation ne serait qu'une histoire banale de sevrage intempestif, si le motif invoqué par la mère, pour cesser de donner le sein à son enfant, n'était tout particulièrement de na-

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris

St-LEGER TONI-ALCALINE

SOLUTION PAUTAUBERGE
EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRHALE et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

DRAGÉES de FER COGNET
Protoxalate de Fer et Quassine cristallisée.
LE PLUS ACTIF DES FERRUGINEUX

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

POLY-FORMIATE de Couturieux
6 à 12 comprimés par jour.
COUTURIEUX, pharmacien, 57, av. d'Antin.

TRIBROMURE de GIGON
MALADIES NERVEUSES

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE LAINCAR
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin. { Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin.

Plus d'odeur. Plus de dégoût. { VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

ture à attirer l'attention de ceux d'entre nous, qui, avec nos maîtres Budin, Pinard, Marfan, « ont entrepris en France l'œuvre du relèvement de l'allaitement maternel. »

Questionnée par nous sur les raisons qui l'avaient décidée à sevrer son enfant, Mme D... nous montra le certificat suivant :

LABORATOIRE MUNICIPAL DE CHIMIE

ANALYSE QUALITATIVE N° 189

Le Directeur du Laboratoire municipal certifie que l'échantillon déposé sous le n° 132 par Mme D..., est mauvais.

Paris le 27. 1. 1906.

Signé :

Le Directeur du Laboratoire municipal.

(Timbre du Laboratoire.)

Toute personne qui usera du présent bulletin pour nuire à la réputation d'autrui commettra le délit de diffamation.

« Je ne pouvais, ajouta-t-elle, continuer à donner le sein à mon bébé, puisque *mon lait avait été reconnu mauvais* à l'analyse du Laboratoire municipal. »

Bien convaincu à ce moment que je me trouvais en présence d'une erreur matérielle et que par suite d'indications peu précises, cet échantillon de lait humain avait été pris pour un échantillon de lait animal, j'ai demandé par lettre des renseignements complémentaires à Monsieur le directeur du Laboratoire municipal, et j'en ai reçu la réponse que voici :

LABORATOIRE DE CHIMIE

—

Prière de rappeler le n° ci-dessous.

N° 22.

Lait de femme.

PRÉFECTURE DE POLICE

—

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

—

Paris, le 21/2 1906.

Monsieur,

En réponse à votre lettre d'hier concernant un lait de femme, j'ai l'honneur de vous faire connaître que ce lait a été reconnu mauvais par insuffisance de beurre, 2.26.

Agréez, Monsieur, etc.

Ainsi, sur une seule analyse, d'après un prélèvement opéré sans la moindre garantie, sans aucun renseignement complémentaire, un chimiste officiel déclare sans hésitation qu'un lait de femme est mauvais, parce qu'il donne à l'analyse 22 gr. 6 de beurre par litre.

Cependant, il y a quelques semaines, je lisais dans un article très documenté de M. Deval sur « Les variations de la composition du lait de femme »[1] : « Chez une même femme les variations des éléments du lait peuvent être considérables, quelles que soient les précautions prises pour le prélèvement. » L'auteur signale un cas où, « sous l'influence du chagrin et de l'ennui éprouvés, le beurre a diminué brusquement jusqu'à 20 grammes, pour remonter peu à peu et atteindre la valeur de 50 grammes », et il conclut « qu'il est sage avant d'apprécier le lait d'une nourrice, de faire plusieurs analyses espacées par un certain intervalle. »

En publiant pour les lecteurs de *La Presse Médicale* cette histoire édifiante, j'ai voulu montrer ce qu'il y a de téméraire et, oserai-je ajouter, de dangereux dans l'affirmation si catégorique du Laboratoire municipal pour l'opposer à cette conclusion de Pagès[2], physiologiste et chimiste dont l'autorité sur cette question est indiscutable : « après avoir poursuivi pendant plusieurs années l'étude chimique du lait, nous sommes obligés de reconnaître que cette étude ne fournit que quelques indications; qu'elle est impuissante en tout cas, à déterminer la valeur alimentaire de ce liquide et qu'elle cède le pas, de beaucoup à l'observation pratique; l'élevage d'un enfant ou d'un jeune animal en dit plus que les analyses les plus irréprochables. »

Quelle sera désormais la conduite d'un médecin, désireux d'obtenir d'une jeune mère un allaitement au sein, lorsqu'on lui présentera une analyse d'un laboratoire officiel déclarant que le lait de sa cliente est mauvais, parce que sa teneur en beurre est inférieure à celle du lait de vache normal? Je pose la question à mes confrères!

Pour l'instant, je crois qu'en présence de cette nouvelle incursion de la chimie sur le terrain de la médecine pratique, il n'est pas inutile de redire une fois encore avec Charcot : « Le laboratoire doit être dirigé par la clinique; il peut l'éclairer, mais non la diriger. »

ARMAND CAREL.

1. DEVAL. — *La Presse Médicale*, 1905, n° 93, p. 749.
2. PAGÈS. — Les méthodes pratiques en zootechnie, p. 61. Paris, 1898.

CORRESPONDANCE

La mort subite dans l'enfance.

La mort subite dans l'enfance continue à intéresser nos lecteurs. A propos de la note que nous a envoyée M. Maurice Perrin (de Nancy) (*La Presse Médicale*, 1906, 10 Mars, n° 20), nous recevons la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur en chef,

Je viens de lire dans l'un des derniers numéros de *La Presse Médicale* la très intéressante communication de M. Maurice Perrin (de Nancy), relative *à la mort subite dans l'enfance*. Dans cette note, après avoir rappelé l'observation recueillie en 1903 à la clinique de M. Haushalter dans laquelle *neuf* enfants d'une même famille avaient succombé brusquement les uns après les autres dans une sorte de coma de très courte durée, après avoir cité le travail de M. Hedinger de (Königsberg), (*Mort subite familiale des enfants*), reposant sur cinq observations, dont une avec autopsie, après avoir rapporté un nouveau cas inédit recueilli en 1896, à la clinique de M. Haushalter, notre distingué confrère arrive à cette conclusion que la mort sur-

HEYDEN

CRÉOSOTAL — **Action curative de la créosote** sans ses effets secondaires et caustiques. **Remède le plus efficace contre la phtisie** (alterner avec le Duotal Heyden); **antiscrofuleux** interne supérieur; à hautes doses : 10 à 15 gr. par jour (enfants, 1 à 6 gr.), en 4 fois, résultat certain et rapide dans toutes les **affections aiguës des voies respiratoires.**

XÉROFORME — **Le meilleur succédané de l'iodoforme** : inodore, non toxique, analgésique, hémostatique et stérilisable. Aucune action irritante, ne cause jamais d'eczéma. Spécifique dans les **eczémas humides, l'intertrigo, les ulcères de jambes et les brûlures.**

CALOMELOL — (Calomelol colloïdal). Solubilité beaucoup plus grande que celle du calomel; beaucoup moins toxique; ne se dédouble pas en sublimé; réaction neutre. Teneur en mercure 66 p. 100. — **Calomelol** en poudre pour le traitement des chancres et ulcères syphilitiques et en comprimés à 1 centigr.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

Littérature et échantillons chez le Représentant : **Paul ROUVEL**, *3, rue du Plâtre, Paris (4e).*

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ie chez les enfants dans les conditions précitées
j'explique suffisamment que par la compression
cée par le *thymus hypertrophié*, que cependant
e hypertrophie du thymus n'est pas la seule
ication possible de ces morts rapides et que
ident peut invoquer une des étiologies suivantes :
ons cérébrales ou bulbaires latentes, artérites
meuses chez les hérédo-syphilitiques, néphrite
onnue avec urémie, névrite du pneumo-gastrique,
cope cardiaque etc.

e ne saurais pour ma part accepter les assertions
ses par notre savant confrère de Nancy. Je les ai
combattues il y a longtemps dans une dissertation
inaugurale (*Du spasme de la glotte* 1847), et les
uments que je faisais valoir à cette époque n'ont
perdu de leur force.

la pensée peut être résumée dans ces deux propositions :

'asthme thymique des Allemands n'existe pas.

'affection à laquelle succombent les enfants est
affection nerveuse, convulsive (spasme de la
tte compliqué ou non du spasme du diaphragme,
quelquefois de phénomènes convulsifs d'autres
ties du corps, véritable attaque d'éclampsie).

our ce qui est de la première proposition, j'ai
ntré dans ma thèse que dans les cas où j'ai pu faire
topsie des enfants qui avaient succombé, le thymus
t le plus souvent petit, du poids de 2 à 4 grammes,
ement hypertrophié (17 gr. 50 centigr. dans un
). N'est-il pas dès lors évident que si l'hypertro-
e du thymus était la cause des accidents de suffo-
on nous aurions dû trouver cette hypertrophie
s tous les cas, ce qui n'est pas, comme je viens
e dire.

'un autre côté et c'est là la partie originale et
velle et de mes recherches, le volume et le poids
thymus varient beaucoup, depuis 2 grammes jus-
à 56 grammes (obs. de Kornmaul) en rapport avec
onstitution et l'embonpoint de l'enfant : celui-ci
il robuste, gros et gras le thymus est d'un fort
ume. L'enfant est-il au contraire faible, amai-
et c'est le cas le plus ordinaire à l'hôpital, le
mus est d'un petit volume. Ceci nous explique
rquoi dans les cas de morts subites on a trouvé
autopsie le thymus tantôt hypertrophié, tantôt
lus souvent d'un petit volume.

C'est après un examen minutieux de 60 enfants morts d'affections diverses que j'ai pu formuler les propositions suivantes.

Le thymus est un organe dont le volume et le poids sont excessivement variables chez les enfants en bonne santé.

La constitution de l'enfant, son état de maigreur ou d'embonpoint semblent être les principales conditions qui influencent ces variations.

Dans l'asthme soi-disant thymique aussi bien que dans toutes les autres maladies du premier âge le thymus a dû nécessairement être rencontré, tantôt petit, tantôt volumineux, suivant que l'enfant était faible ou robuste, mais il n'entre pour rien dans la production de ces affections.

L'asthme thymique n'existe pas.

Je n'aurais pas de peine à démontrer la deuxième proposition, à savoir que l'affection qui emporte si brusquement les enfants est une névrose convulsive, une *convulsion interne* ayant pour siège le larynx et quelquefois simultanément le diaphragme; tout l'indique, causes, symptômes, marches, traitement. Quelle autre maladie qu'une névrose convulsive présente ce type franchement intermittent? Comme l'éclampsie elle attaque souvent plusieurs membres d'une même famille et peut tuer l'enfant en quelques secondes.

C'était l'opinion du professeur Trousseau. Ce fut également celle des savants experts, professeurs Brouardel et Thoinot, qui récemment dans un émouvant procès démontrèrent la non-culpabilité de la femme Weber, à la grande stupéfaction du public ignorant et passionné.

Dr Hérard,
Membre de l'Académie de médecine.

A travers le Monde

AUTRICHE

•‡• Vienne possédera bientôt un des plus grands hôpitaux du monde entier. Cet établissement occupera 21 hectares de terrain; il aura 40 quartiers, qui contiendront 2.300 lits pour les malades. Il comprendra enfin 32 cliniques entourées de jardins d'agrément pour les sujets atteints de maladies de poitrine.

CEYLAN

•‡• On a trouvé récemment des gisements de thorium (thorianite et thorite) à Ceylan, qui ne semblent pas pouvoir donner de produits commerciaux pour l'éclairage à l'incandescence, mais dont on achète cependant les minerais un prix très élevé, à peu près le double du prix normal, pour les laboratoires anglais, en raison du radium et de l'hélium que l'on y a reconnus.

LIVRES NOUVEAUX

L. Bouchacourt, ancien chef de clinique obstétricale à la Faculté de Médecine de Paris. — *Hygiène de la grossesse et puériculture intra-utérine*, avec une préface de M. le professeur Budin. 1 vol. in-18 de 518 pages avec 7 planches hors texte, 1905. (O. Doin, éditeur.)

Ce petit *Traité d'hygiène de la grossesse* ne s'adresse pas seulement aux femmes enceintes, comme son titre pourrait le faire supposer; il intéresse les médecins, les éleveurs, les avocats, les philanthropes et tous ceux ayant quelque souci des questions sociales.

L'auteur est resté fidèle à sa méthode habituelle de travail, qui consiste à faire de larges emprunts aux faits tirés de la série animale et aux observations provenant de la pratique vétérinaire; comme précédemment, il a émaillé son texte d'anecdotes qui en rendent la lecture plus agréable.

Après avoir fait l'historique à travers les âges des variations dans la durée de la gestation, M. Bouchacourt passe en revue les causes si nombreuses qui sont capables d'abréger — ou même parfois d'allonger — la durée physiologique de la grossesse.

Ce petit *Traité de la grossesse*, fait à un point de vue tout spécial et particulièrement intéressant, contient l'exposé détaillé des moyens que la nature, la science et l'observation mettent à la disposition de la femme enceinte pour réduire à leur minimum ces chances de mettre au monde un enfant débile.

P. D.

SOCIÉTÉ DE THÉRAPEUTIQUE
(Séance du 22 juillet 1885)

M. le Dr Dujardin-Beaumetz, membre de l'Académie de Médecine, fait la communication suivante :

« J'ai l'honneur de présenter à la Société de thérapeutique des préparations qui m'ont rendu de grands services, tant à l'hôpital que dans ma clientèle.

Depuis près d'un an, j'emploie contre l'anémie un sirop d'hémoglobine préparé par un nouveau procédé de fabrication imaginé par un de mes élèves, M. Deschiens.

Il m'a donné, à la dose de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, des résultats véritablement merveilleux dans le traitement des anémies et de la chlorose. J'ai pu constater, à l'aide de la numération des globules, son action très rapide sur leur régénération.

Je ne saurais trop recommander cette préparation et je la considère comme le plus puissant des ferrugineux. »

Laboratoires à Meulan (S.-&-O.).

PRODUITS TARDIEU & Cie
Pharmaciens de 1re Classe

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 436-63

Applications de l'IODE et des IODURES SANS IODISME
"IODOR"
Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode — 20 gouttes correspondent à 2 grammes d'iodure ou à 8 centigr. d'iode combiné.
Adultes : 15 à 50 gouttes } dans de l'eau
Enfants : 5 à 25 gouttes } à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCULATION
(DYSMÉNORRHÉE, MÉNOPAUSE, HÉMORROÏDES, VARICES).
"HÉMAMÉNINE"
Hamamelis, Hydrastis, Piscidia, etc.
4 à 8 dragées par jour.

Contre la LEUCORRHÉE
HYGIÈNE VAGINALE
"FORMINOL"
Emulsion formolée, d'odeur agréable.
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPSIE Générale externe
PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES
"SANOFORME"
Formaldéhyde émulsionnée.
(1 cuill. à soupe pr 1 litre d'eau bouillie).

GARGARISME Prophylactique
et Curatif des Affections de la GORGE et du LARYNX
"PHARYNGINE"
Thymol, Eucalyptol, Essences anticatarrhales, balsamiques.
10 Gouttes dans un verre d'eau tiède en gargarisme.
30 Gouttes dans de l'eau bouillante en inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

ALIMENTATION des CONVALESCENTS et des VIEILLARDS
"FARINE SAMSON"
Phosphates naturels assimilables. Germes de blé, Malt d'avoine, Farine de lentilles.
En bouillie : de 5 à 10 cuillerées dans du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS Intramusculaires INDOLORES
à efficacité très rapide.
"HYDRARGOL"
Ampoules de 1cmc de Succinimide d'Hg. chimiquement pure équivalent à 7 millig. d'Hg.
1cmc par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION
"ZOMYO-BEEF"
Suc musculaire de bœuf concentré à froid, Glycérophosphaté.
Propriétés physiques et thérapeutiques conservées indéfiniment.
DOSE DE STIMULATION :
1 cuillerée à café avant chaque repas.
DOSE DE SURNUTRITION :
2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION
"LAXYL"
EFFERVESCENT
Laxatif, entièrement soluble, agréable et très actif.
Dose laxative : 2 cuillerées à café.
Dose purgative : 2 cuillerées à bouche.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faubg St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la Mon TARDIEU & Cie sont réglementées

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et Cie, Paris.**

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAG
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
L'APIOL des DOCTrs JORET & HOMOLL
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharma

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée,** celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I. Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules
dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)
25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

DIADERMINE

Nouvel Excipient pour Pommades.

Remplace la Vaseline, l'Axonge, la Lanoline, etc., sur lesquels elle présente les avantages d'être **complètement neutre, soluble à l'eau et absolument inaltérable.** — Remarquablement absorbée par la peau. Ne tache pas le linge. — Expérimentée à l'hôpital Saint-Louis (Voir *Bull. de la Soc. franç. de Dermat. et Syph.* janv. 1906, n° 1, p. 24). — *Echantillons gratis.* **BONETTI frères, 12, rue Vavin, PA**

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent **impures** et **falsifiées** (Huchard);
Sont d'origine et d'action **différentes** (Pr Pouchet);
Sont rarement **exemptes de caféïne** (Vadam);
Ne sont pas toujours **bien supportées** (Monin);
Déterminent fréquemment des **Céphalées** (Huchard);
Provoquent souvent des **Troubles digestifs** (Calonne);
Sont en certains cas **lentes à agir** (Metifeu);
Se montrent trop fréquemment **inconstantes** (Raspail);
Restent parfois même **inactives** (Dubois).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE,** qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un *PRODUIT FRANÇAIS*, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

1° La **SANTHÉOSE PURE,** puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
2° La **SANTHÉOSE PHOSPHATÉE,** recommandée dans les infections et les convalescences;
3° La **SANTHEOSE CAFÉINEE,** grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, etc.:
4° La **SANTHEOSE LITHINEE,** traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute ***substitution ou contrefaçon***, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix *meilleur marché* que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4e).

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* « *Digitaline ou Aconitine* ».

COMPRIMÉS DE DIGITALE
H. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale,** titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline cristallisée.
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE
H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes calibré* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE
au dixième de milligramme *(4 à 10 en 24 heures).*

Ampoules propulsives (Brevet Robert et Carrière). de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligramme *(1 à 4 en 24 heures.)*
(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

ALCOOLATURE D'ACONIT
H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée,** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures).*

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/10 milligr. *(2 à 5 en 24 heures).*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist.
H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures).* **(Directement injectables).**

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 28 Mars 1906, à 1 heure. — M. Ferry : Valeur comparée de l'hysteropexie abdominale directe et de l'hysteropexie médiate intra-péritonéale par les ligaments ronds dans les rétro-déviations; MM. Terrier, Brissaud, Reclus, Teissier. — M. Monteil : Contribution à l'étude du liquide parotidien; MM. Brissaud, Terrier, Reclus, Teissier. — De Lastic : La pathologie mentale dans l'œuvre de Flaubert; MM. Brissaud, Terrier, Reclus, Teissier. — M. A. Lancet : La température et le pouls dans quelques appendicites aiguës; MM. Reclus, Terrier, Brissaud, Teissier,

Jeudi 29 Mars 1906, à 1 heure. — M. Bolot : Considérations sur le massage, abdominal dans les affections du tube digestif; MM. Debove, Joffroy, Hutinel, Achard. — M. Sagory : Contribution à l'étude des adénomes sébacés symétriques de la face; MM. Joffroy, Debove, Hutinel, Achard. — M. Schwartz : Contribution à l'étude de pleurésies à signes pseudo-cavitaires chez les enfants; MM. Hutinel, Debove, Joffroy Achard. — M. Labrevoit : Tuberculose et adipose; MM. Chantemesse, Roger, Méry, Gouget. — M. Ghevrel : Bacilles paratyphiques et infections paratyphoïdes; MM. Roger, Chantemesse, Méry, Gouget.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 26 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Poirier, Mauclaire, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Legry. Epreuves pratiques. — 1er, Oral, (1re série), : MM. Terrier, Cunéo, Branca. — 1er, Oral (2e série) : MM. Reclus, Sebileau, Macaigne. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Brissaud, Gaucher, Balthazard. M. Gautier, censeur; M. Teissier, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Kirmisson, Delens, Pierre Duval. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Segond, Legueu, Proust. M. Dejerine, censeur; M. Richaud, suppléant.

Mardi 27 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Hartmann, Rieffel. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 1er, Oral : MM. Berger, Thiéry, Launois, — 4e : MM. Chantemesse, Robin, Dupré. M. Gilbert, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Charité : MM. Guyon, De Lapersonne, Marion. — 5e (Première partie) (2e série), Charité : MM. Le Dentu, Auvray, Morestin. — 5e (Deuxième partie), Charité : MM. Dieulafoy, Méry, Renon. M. Hutinel, censeur; M. Vaquez, suppléant.

Mercredi 28 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Rieffel, Pierre Duval. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Gautier, Legry, Balthazard. Epreuves pratiques. — 1er, Oral (1re série) : MM. Blanchard, Mauclaire, Macaigne. — 1er, Oral (2e série) : MM. Poirier, Legueu Cunéo. — 1er, Oral (3e série) : MM. Segond, Sebileau, Branca. — 2e : MM. Ch. Richet, Retterer, Broca (André). M. Landouzy, censeur; M. Claude, suppléant.

Jeudi 29 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Guyon, De Lapersonne, Rieffel, — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Desgrez, Guiart. Epreuves pratiques. — 1er, Oral : MM. Poirier, Launois, Morestin. — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Jeanselme. — 4e MM. Raymond, Vaquez, Langlois. M. Pozzi, censeur; M. Dupré, suppléant.

Vendredi 30 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Cunéo, Proust. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Blanchard, Desgrez, Macaigne. Epreuves pratiques. — 1er, Oral (1re série) : MM. Kirmisson, Legry, Rieffel. 1er, Oral (2e série) : MM. Reclus, Sebileau, Branca. — 2e : MM. Gariel, Ch. Richet, Retterer. — 3e, Oral (Deuxième partie) : MM. Brissaud, Teissier, Labbé (Marcel), — 4e : MM. Pouchet, Dejerine, Richaud, M. Roger, censeur; M. Gosset, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie) Clinique Baudelocque : MM. Pinard, Wallich, Potocki. M. Claude, suppléant.

Samedi 31 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Berger, Thiéry, Auvray. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Chantemesse, Guiart, Maillard. Epreuves pratiques. — 1er, Oral (1re série) : MM. Cornil, Retterer, Marion. — 1er, Oral (2e série) — MM. De Lapersonne, Launois, Morestin. M. Le Dentu, censeur; M. Langlois, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Beaujon : MM. Raymond, Thiroloix, Gouget. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Beaujon : MM. Roger, Méry, Jeanselme. — 5e, (Deuxième partie) (3e série), Beaujon : MM. Robin, Achard, Bezançon. M. Gilbert, censeur; M. Rénon, suppléant.

Médecine opératoire spéciale. — M. Paul Bouchet, prosecteur, commencera un cours pratique de *chirurgie générale et chirurgie infantile* le mardi 12 Juin 1906, à 8 heures du matin.

1° Bec-de-lièvre. Staphylorraphie. Torticolis. Ténotomies. Ganglions du cou, abcès du cou, différentes incisions suivant les loges. — 2° Mastoïdite. Trépanation. Abcès du cerveau et du cervelet. Complications intracraniennes post-otitiques. — 3° Les autoplasties (les différentes méthodes). — 4° Adénoïdes du pharynx; abcès péri-pharyngiens. Amygdales. Polypes naso-pharyngiens; voies d'accès. Ostéomyélite de la mâchoire. — 5° Tubage. Trachéotomie. Ankylose de la mâchoire. Traitement des ankyloses par l'interposition musculaire. — 6° Corps étrangers du pharynx, de l'œsophage, de la trachée, des bronches. Laryngotomie; pharyngotomie; œsophagotomie. Panier de Græfe. Crochet de Kirmisson. Œsophagoscopie et bronchoscopie. Pleurotomie avec ou sans résection costale. — 7° Ectopie testiculaire. Hydrocèle. Hernies inguinales. Appendicite. Drainage large du péritoine. — 8° Invagination intestinale. Anus contre nature. Prolapsus du rectum. Ostéomyélite aiguë des membres. Trépanation. — 9° Hallus valgus. Orteil en marteau. Pied bot. Pied plat valgus douloureux. Opération d'Ogston. Arthrotomies pour arthrites purulentes : genou, coude, épaule, hanche tibio-tarsienne. — 10° Genu valgum. Réduction non sanglante de la luxation congénitale de la hanche. Arthrodèses. Anastomoses musculo-tendineuses; transplantations tendineuses (après la paralysie infantile).

Le cours aura lieu tous les jours.

Les élèves répéteront les opérations sous la direction du prosecteur.

Le nombre des élèves admis à ce cours est limité. Le droit à verser est de 50 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — M. Simonin, médecin-major de 1re classe à la direction du service de santé au ministère de la Guerre, est nommé professeur (médecine légale, législation, administration et service de santé militaires), à l'École d'application du service de santé militaire.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Rolland, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Forbin* (escadre du Nord).

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie, — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Mg O2 HOPOGAN Usage Interne

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'Usage Médical 17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Zn O2 Usage Externe

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Dépôt Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et tres Pharmacies.

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE (GRANULÉ)
Acide phosphorique ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse
Biphosphate de Fer
FORMULE ET PROCÉDÉ DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. — Enfants : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, Ancien interne des Hôpitaux.
Usine et Dépôt : 15, r. de Paris, Puteaux, Seine
Toutes Pharmies. Spécialité réglementée.

PHOSPHATURIE — NEURASTHÉNIE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ECHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

orps de santé des troupes coloniales. — M. le ecin-major de 2e classe Bouet, détaché à l'Institut eur de Paris, a été maintenu à la disposition du mi- re des colonies pour faire partie d'une mission scien- ue en Afrique occidentale française.

M. le médecin-major de 2e classe Rigaud, est désigné remplir les fonctions de chef du service de santé à éunion.

Médecin de l'état civil. — M. Weil, médecin du eau de bienfaisance du XVIe arrondissement, a été mé médecin de l'état civil dudit arrondissement, en placement de M. Barbe.

ociété normande d'hygiène pratique. — Le bureau r l'année 1906 est composé comme suit : MM. Lainey, ident; Tourdot, François Hue, vice-présidents; Guer- secrétaire; Seyer, trésorier.

n nouvel hôpital à Nice. — On vient d'inaugurer ce, sous la présidence de la princesse Christine de leswig-Holstein, le nouvel hôpital anglais. Cet établis- ent porte le nom de « Victoria Queen Memorial ».

ociété de chirurgie de Marseille. — On annonce ormation, à Marseille, d'une société de chirurgie dont ureau est composé comme suit : MM. Combelat, pré- nt; Pantaloni, vice-président; Imbert, secrétaire gé- al; Pieri, secrétaire.

CONCOURS

Dentiste des hôpitaux. — Epreuve clinique. — *nce du 19 Mars.* — Ont obtenu : MM. Page, 19; Bel- d, 18; Mahé, 18.

Assistance médicale. — Epreuve clinique. — *nce du 16 Mars.* — Ont obtenu : MM. Naïs, 23; uvy, 25; Poulain, 28.

éance du 17 Mars. — Ont obtenu : MM. Catz, 29; in, 24; Petit, 20.

éance du 19 Mars. — Ont obtenu : MM. Friedel, 22; noret, 22; Bourilhet, 21. — *Absent* : M. Pierart.

Médaille d'or (médecine). — Le concours de la mé- lle d'or vient de se terminer par l'attribution des ré- mpenses suivantes : 1er prix (médaille d'or), M. Lœde- r; 2e prix (médaille d'argent), M. Roussy; accessit, Halbron.

Internat. — Oral. — *Séance du 16 Mars.* — *Artère litée. Fractures de la rotule.* — Ont obtenu : MM. Macé Lépinay, 15; Lasnier (Maurice), 15; Chevallier, 14; Touraine, 13; Bénazet, 11; Marsan, 15; Charrier, 12; Chabrol, 18; Porée, 11; Cottenot, 13.

Séance du 17 Mars. — Structure de la peau. Symptômes et complication de la rougeole. — Ont obtenu : MM. Pérol, 12; Duchet-Suchaux, 11; Bénard (Henri), 17; Regnard; Verdoux; Deroye, 13; Debré, 13; Lenoir, 9; Duvoir, 13; Basset, 10.

Totalisation des points. — MM. Macé de Lépinay, 15 + 25 = 40; Lasnier (Maurice), 15 + 24 = 39; Chevalier, 14 + 22 = 36; Touraine, 13 + 21 = 34; Bénazet, 11 + 16 = 27; Marsan, 15 + 22 = 37; Charrier, 12 + 19 = 31; Chabrol, 18 + 27 = 45; Porée, 11 + 19 = 30; Cottenot, 13 + 19 = 32; Pérol, 12 + 22 = 34; Duchet-Suchaux, 11 + 21 = 32; Bénard (Henri), 17 + 23 = 40; Regnard, 18; Verdoux, 17; Deroye, 13 + 22 = 35; Debré, 13 + 23 = 36; Lenoir, 9 + 18 = 27; Duvoir, 13 + 22 = 35; Basset, 10 + 22 = 32.

Elèves en pharmacie des dispensaires. — Un concours pour la nomination à 25 places d'élève en pharmacie des dispensaires de l'Assistance publique sera ouvert le mercredi 2 Mai 1906, à midi, dans la salle des concours de l'administration, 49, rue des Saints-Pères. Cette séance sera consacrée à la composition écrite.

MM. les élèves en pharmacie qui désireront concourir seront admis à se faire inscrire au service du personnel de l'administration, de midi à 3 heures, jusqu'au samedi 14 Avril 1906 inclusivement.

Conditions du concours. — Tout candidat ou candidate au concours pour les places d'élève en pharmacie des dispensaires de l'Assistance publique doit être âgé de vingt ans au moins et de vingt-sept ans au plus au 1er Janvier de l'année du concours et justifier d'au moins 4 inscriptions de scolarité prises dans une école de pharmacie.

Il doit produire :

1° Son acte de naissance;

2° Un certificat de revaccination;

3° Un certificat de bonnes vie et mœurs;

4° Un certificat délivré par l'Ecole de pharmacie et constatant d'une part qu'il a subi avec succès son examen de première année, et d'autre part qu'il est en cours d'études.

Les candidats qui désirent prendre part au concours doivent se présenter au service du personnel de l'administration pour obtenir leur inscription, en déposant leurs pièces et signer au registre ouvert à cet effet. Les candidats absents de Paris ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre chargée.

Toute demande d'inscription faite après l'époque fixée par les affiches pour la clôture du registre ne peut être accueillie.

La durée des fonctions des élèves en pharmacie des dispensaires est fixée à un an, mais ils peuvent être prorogés successivement pendant une deuxième et une troisième année, sur la proposition des pharmaciens.

Les élèves en pharmacie des dispensaires sont subordonnés, sous le rapport du service de la pharmacie, au pharmacien du dispensaire, et, sous le rapport administratif, au secrétaire-trésorier du bureau de bienfaisance, auquel est rattaché le dispensaire.

Ils concourent à la préparation et à la distribution des médicaments, sous la direction et la responsabilité du pharmacien. Ils font le relevé journalier des ordonnances et des bons.

Les élèves en pharmacie des dispensaires reçoivent une indemnité variable suivant leur année d'exercice (1.200 francs pour la 1re année, 1.300 francs pour la 2e et 1.400 pour la 3e). Ils n'ont droit ni au logement, ni à la nourriture.

Tout élève qui obtient le diplôme de pharmacien pourra être maintenu en fonctions pendant une durée de trois mois, renouvelable s'il y a lieu. En tout état de cause, le délai accordé ne pourra dépasser la fin de l'année d'exercice.

Aucun élève ne peut tenir de pharmacie en ville, ni faire le commerce de drogues simples ou composées, ou de plantes médicinales.

RENSEIGNEMENTS

A céder poste, commune de 2.000 hab., 7 communes à desservir, seul médecin. Aff. 8.000 fr. S'adr. *P. M.*, 241.

MM. Jomier, ancien interne, et **Ockynczic**, aide d'anatomie, interne médaille d'or, commenceront prochainement une *conférence privée d'internat.* S'adr. : *P. M.*, 244.

Dame tr. sér., hte réf. dem. entr. rapp. avec méd. ou chir. pr fd. Mson de santé. Mme Mansire, 16, Gde R. (St.-Mandé).

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^{ts} grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Dans famille, on louerait avec ou sans pension, jolie chambre à étudiant ou étudiante sérieux (face gare Sceaux). Ecrire Jesberger, 99, boulevard Arago.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,*
complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement
1 gr. d'Iodure chimiquement pur.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur*
complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement
5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCETRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie **GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirop d'Hypophosphite de **CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ**, etc., du **Dr CHURCHILL**
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES.

Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE *au Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rapports scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

MALADIES DE L'ESTOMAC ET DE L'INTESTIN

CHARBON TISSOT

(CHARBON DE PEUPLIER)

AGGLOMÉRÉ AU GLUTEN — AROMATISÉ A L'ANIS

Très légèrement additionné de Benzoate de Naphtol.

Absorption facile, Pas de Brûlures, Pas de Nausées

POUVOIR ABSORBANT CONSIDÉRABLE

DIGESTIONS PÉNIBLES, DILATATIONS, CONSTIPATION
BALLONNEMENTS, DIARRHÉES, COLITES, etc.

DÉPÔT: 34, Boulevard Clichy, PARIS *et dans toutes Pharmacies.*

ENGHIEN (SEINE-ET-OISE) -LES-BAINS

Eaux les plus sulfureuses de France

(33 cc. d'Hydrogène sulfuré par litre)

Affections des Voies respiratoires, Rhumatisme, Peau

EXPÉDITION D'EAU

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRE

MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.

KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**

CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2

Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX

Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

EUKINASE

EUPEPTIQUE INTESTINAL

H. CARRION & Cie

54, Faubg Saint-Honoré, Paris

TÉLÉPHONE 136.64

PANCRÉATO-KINASE

DIGESTIF PUISSANT

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.